

Dodatek dla farmaceuty - Infekcje wirusowe przebiegające z biegunką.

1. Tabela

Preparat	Dawkowanie	Ważne informacje
Diosmektyl	<p>Dzieci < 1 r. ż: 1 sz/d</p> <p>Dzieci 1 – 2 r. ż: 1 – 2 sz/d</p> <p>Dzieci > 2 r. ż: 2 – sz/d</p> <p>Dorośli: 3/dz na początku leczenia, w przypadku ostrej biegunki, można podwoić dawkę dobową.</p>	<p>Dzieci: saszetkę rozpuścić w 50 ml wody i podawać małymi porcjami lub wymieszać z półpłynnymi pokarmami (bulion, przecier owocowy jarzynowy, dania w słoikach)</p> <p>Dorośli: saszetkę rozpuścić w 0,5 szklanki wody, przyjmować między posiłkami.</p> <p>UWAGA: nie podawać z innymi lekami, zachować 2h odstępowod innych leków.</p>
Carbo medicinalis	<p>Dorośli i dzieci > 12 r. ż: jednorazow 4,0 g w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek. Dawkę można powtarzać co kilka godzin.</p>	<p>UWAGA: nie podawać z innymi lekami, zachować 2h odstępowod innych leków.</p> <p>Węgiel barwi stolec na czarno.</p>
Loperamid	<p>Dzieci 6 – 12 r. ż: 2 mg po każdym luźnym stolcu, maksymalnie 6 mg.</p> <p>Dorośli i dzieci >12 r. ż: początkowo 4 mg, a następnie 2 mg po każdym luźnym stolcu, maksymalnie 16 mg.</p>	<p>UWAGA: natychmiast przerwać leczenie w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.</p> <p>NIE STOSOWAĆ: rzekomobłoniaste zapalenie jelit (po antybiotykach), ostre wrzodziejące zapalenie jelit, niedrożność jelit, krew w kale.</p>
Debutir	<p>Dzieci > 7 r. ż: 1 dz. x 1 k.</p> <p>Dorośli: 2 dz. x 1 k.</p> <p>Kapsułkę połknąć i popić letnią lub chłodną wodą. Najlepiej w trakcie posiłku,</p>	<p>Produkt posiada charakterystyczny zapach.</p> <p>Przyjmowanie kapsułek przez dłuższy czas może prowadzić do przyrostu masy ciała.</p>
Tasectan	<p>Dzieci < 3 r. ż: 1 saszetka co 6 h. do ustąpienia objawów.</p> <p>Dzieci 3 – 14 r. ż: 1-2 saszetek co 6 h. do ustąpienia objawów.</p> <p>Dorośli: 1-2 kapsułki co 4 – 6 h. Do ustąpienia objawów.</p> <p>Kapsułki połknąć popijając wodą.</p> <p>Saszetki rozpuścić w szkalnce wody, można dodać do soku owocowego lub jogurtu.</p>	

Quecor	Dorośli: 2-3 tabl. jednorazowo maksymalnie 9 tabl. na d.		Ze względu na zawartość garbników preparat może osłabiać wchłanianie leków oraz wiązać się z jonami żelaza, magnezu oraz białkami.	
Taninal	Dzieci > 4 r. ż: 1/2-1 tabl. 2-3 razy na d. Dorośli: 1-2 tabl. 3 razy na d. Tabletki popić wodą przyjmować między posiłkami.		UWAGA: nie podawać z innymi lekami, zachować 2h odstępow od innych leków.	
DPN (doustne płyny nawadniające)		NAWADNIANIE	NAWADNIANIE PODTRZYMUJĄCE	Do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać. Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczką. Roztworu nie należy dosładzać. Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).
		50–100 ml/kg masy ciała w ciągu pierwszych 3-4 godzin.	5-10 ml/kg masy ciała po każdym luźnym stolcu lub wymiotach,	
	Waga			
	< 4 kg	200-400 ml	50 ml	
	4-8 kg	400-800 ml	50 – 100 ml	
	8-12 kg	800-1200 ml	100 – 150 ml	
	> 12 kg	>1200 ml	100 – 200 ml	
Surowce zielarskie stosowane pomocniczo w leczeniu biegunki:				
Owoc Borówki Czernicy <i>Myrtilli fructus</i>	Dawkowanie według zaleceń producenta.			
Kłącze Pięciornika <i>Tormentillae rhizoma</i>				
Ziele Pięciornika Gęsiego <i>Potentillae anserinae herba</i>				
Ziele Bukwicy <i>Betonicae herba</i>				
Ziele Przywrotnika <i>Alchemillae herba</i>				
Liść Jeżyny Fałdowanej <i>Rubi fruticosi folium</i>				
Ziele Rzepiku <i>Agrimoniae herba</i>				