



**Zawiadomienie o zaprzestaniu produkcji, dystrybucji i dostaw
leku TRILAFON (*perphenazinum*)**

10.09.2012

Szanowny Panie Doktorze,

Niniejszym informujemy, że firma MSD podjęła decyzję o zaprzestaniu produkcji, dystrybucji i dostaw produktu leczniczego Trilafon.

Przewidujemy, że dostawy produktu Trilafon Enanthate będą dostępne na polskim rynku do listopada 2012 roku, Trilafon tabletki 2 mg oraz 8 mg do marca 2013, Trilafon tabletki 4 mg do września 2013. Podane daty mogą ulec zmianie w wyniku wzrostu lub spadku zapotrzebowania na produkt Trilafon w ciągu kilku następnych miesięcy.

Rozumiemy, że każda taka decyzja może mieć wpływ na przebieg leczenia pacjentów. Dlatego zawsze starannie rozważamy ich skutki dla pacjentów i lekarzy. W tym przypadku decyzja firmy o zakończeniu wytwarzania produktu leczniczego Trilafon oparta jest na dwóch przesłankach. Po pierwsze proces produkcji jest przestarzały i nie można go już dłużej podtrzymywać z powodów technologicznych. Po drugie dostępne są alternatywy terapeutyczne dla wskazań, w których zarejestrowany jest produkt leczniczy Trilafon. Decyzja ta nie jest związana z jakością produktu oraz kwestami bezpieczeństwa.


Mimo iż produkt leczniczy Trilafon będzie dostarczany na polski rynek do wyczerpania zapasów, sugerujemy, aby zaczęli Państwo omawianie zaistniałej sytuacji z pacjentami i/lub przejście pacjentów do odpowiedniej terapii alternatywnej tak szybko, jak to możliwe. Może to obejmować terapie takie jak:

1. Inne pochodne fenotiazyny z grupą piperazynową zawierające następujące substancje:
 - a. perazynę:
 - i. Peregale tabl. 25 mg i 100 mg, producent Galena,
 - ii. Perazin tabl. 25mg i 100 mg, producent Hasco-Lek,
 - iii. Pernazinum tabl. 25 mg i 100 mg, producent Labor,
 - b. trifluoperazynę w postaci chlorowodoru:
 - i. Apo-Trifluoperazine 5, tabl. Powl. 5 mg i 10 mg, producent Apotex Inc.,

2. Leki z innych grup chemicznych, stosowane w tych samych wskazaniach, co produkt leczniczy Trilafon:
 - a. Alifatyczne pochodne fenotiazyny – chloropromazyna,
 - b. pochodne butyrofenonu – haloperydol,
3. Oraz leki przeciwpsychotyczne o przedłużonym działaniu, podawane domięśniowo:
 - a. dekanian haloperydolu,
 - b. mikrogranulki rysperydonu,
 - c. zuklopentiksol,
 - d. flupentiksol,
 - e. olanzapina (Zypadhera).

Przepraszamy jednocześnie za wszelkie niedogodności, które decyzja może spowodować dla Państwa oraz pacjentów.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z MSD Polska
tel. (48 22) 549 51 00



Iwona Bednarczyk
Medical Affairs Director